

# Cancer du col de l'utérus

## Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus ?

Le cancer du col de l'utérus survient lorsque les cellules qui tapissent le col de l'utérus commencent à se développer de manière incontrôlée.

Votre fournisseur de soins de santé effectuera un examen pelvien et un frottis pour prélever des cellules du col de l'utérus. Ces cellules seront ensuite analysées par un laboratoire pour vérifier la présence de cellules anormales.

## Qu'est-ce que le VPH ?

Le virus du papillome humain (VPH) est un virus courant qui touche aussi bien les hommes que les femmes. La plupart des infections au VPH disparaissent d'elles-mêmes au bout de deux ans, mais certaines durent plus longtemps et sont à l'origine de certains cancers. Le VPH est la principale cause du cancer du col de l'utérus chez les femmes, mais il est également lié aux cancers de la vulve, du vagin, du pénis et de l'anus, ainsi qu'aux cancers de la bouche et de la gorge. Le vaccin contre le VPH peut prévenir les cancers associés

au virus. Il est recommandé de vacciner les filles et les garçons à 11 ou 12 ans, avant qu'ils ne soient exposés au virus.

Un test de dépistage du VPH permet de rechercher le virus à l'origine du cancer du col de l'utérus. Ces tests ne sont recommandés que pour le dépistage chez les femmes âgées de 30 ans et plus.

## Qu'est-ce qu'un test Pap ?

Un test Pap est un test de dépistage qui permet de détecter les changements cellulaires ou les cellules anormales présente dans le col de l'utérus. Ces cellules anormales peuvent être des cellules précancéreuses ou cancéreuses. Mais elles peuvent également correspondre à d'autres types de cellules.) Les cellules sont légèrement grattées ou effleurées sur le col de l'utérus. Elles sont envoyées en laboratoire et examinées au microscope pour vérifier s'il s'agit de cellules normales ou si des changements peuvent être observés.



# Cancer du col de l'utérus

## Quelles sont les personnes qui, selon les directives de dépistage, devraient subir un test ?

- Les femmes âgées de 21 à 29 ans doivent subir un test Pap.
- Les femmes âgées de 30 ans et plus doivent subir un test de dépistage du VPH.
- Les femmes âgées de 30 ans et plus doivent subir un test de dépistage du VPH.

## Taux de cancer du col de l'utérus à Washington DC

- Le nombre de femmes diagnostiquées avec un cancer du col de l'utérus (7,8 pour 100 000) était similaire au taux national (7,7 pour 100 femmes) ayant prévalu entre 2015 et 2019.
- Le nombre de décès dus au cancer du col de l'utérus (2,7 pour 100 000) était supérieur au taux national qui était de 2,2 pour 100 000 femmes entre 2015 et 2019.
- Le taux de dépistage du cancer du col de l'utérus était plus élevé chez les femmes blanches que chez les femmes afro-américaines/noires (85,1 % contre 80,4 %).

Pour plus d'informations sur le cancer du col de l'utérus, consultez la page web du CDC :  
[www.cdc.gov/cancer/cervical/index.htm](http://www.cdc.gov/cancer/cervical/index.htm)

